



**ΤΑΞΗ:** Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
**ΜΑΘΗΜΑ:** ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

**Ημερομηνία:** Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022  
**Διάρκεια Εξέτασης:** 3 ώρες

### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

**A1.** Σελίδα 60. Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες.

**A2.** Σελίδα 31. Ορισμός.

**A3.** 1. Λ, 2. Σ, 3. Λ, 4. Λ, 5. Σ

#### ΘΕΜΑ Β

**B1.** Αν  $\lambda = 1$ , τότε το σύστημα είναι ισοδύναμο με το σύστημα  $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x + y = 1$ .

Το τελευταίο έχει άπειρες λύσεις, επομένως οι  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  ταυτίζονται (συμπίπτουν).

Αν  $\lambda = -1$ , τότε το σύστημα είναι ισοδύναμο με το σύστημα  $\begin{cases} -x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = -1 \\ x - y = 1 \end{cases}$ .

Το τελευταίο είναι αδύνατο, επομένως οι  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  είναι παράλληλες.

**B2.** Η σχετική θέση των ευθειών εξαρτάται από τις λύσεις του συστήματος των

εξισώσεων τους, δηλαδή από το σύστημα  $\begin{cases} \lambda x + y = \lambda^2 \\ x + \lambda y = 1 \end{cases} (\Sigma)$

$$D = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1),$$

$$D_x = \begin{vmatrix} \lambda^2 & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda + 1), D_y = \begin{vmatrix} \lambda & \lambda^2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \lambda - \lambda^2 = -\lambda(\lambda - 1)$$

Αν  $D \neq 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda + 1) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq -1$  και  $\lambda \neq 1$ , τότε το σύστημα έχει μοναδική λύση.

$$(\Sigma) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{D_x}{D} \\ y = \frac{D_y}{D} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{(\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda + 1)}{(\lambda - 1)(\lambda + 1)} \\ y = \frac{-\lambda(\lambda - 1)}{(\lambda - 1)(\lambda + 1)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{\lambda + 1} \\ y = \frac{-\lambda}{\lambda + 1} \end{cases}, \text{ επομένως οι ευθείες } \varepsilon_1, \varepsilon_2$$

τέμνονται στο σημείο  $M\left(\frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{\lambda + 1}, -\frac{\lambda}{\lambda + 1}\right)$ .

**B2.** Αν  $\lambda = 0$ , τότε από B1, οι ευθείες  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  τέμνονται στο σημείο  $M\left(\frac{0^2 + 0 + 1}{0 + 1}, -\frac{0}{0 + 1}\right)$ ,

δηλαδή  $M(1, 0)$ . Το σημείο  $M(1, 0)$  προφανώς ανήκει και στην ευθεία  $\varepsilon_3$ , αφού οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωσή της, συνεπώς οι  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  διέρχονται από το σημείο  $M(1, 0)$ .

### ΘΕΜΑ Γ

**Γ1.**  $2\eta\mu 2\alpha - \eta\mu 2\alpha \sin^2 2\alpha - \eta\mu^3 2\alpha = \eta\mu 2\alpha(2 - \sin^2 2\alpha - \eta\mu^2 2\alpha) =$   
 $\eta\mu 2\alpha[2 - (\sin^2 2\alpha + \eta\mu^2 2\alpha)] = \eta\mu 2\alpha(2 - 1) = \eta\mu 2\alpha.$

### Γ2.

i)  $f(x) = 2(2\eta\mu 2x - \eta\mu 2x \sin^2 2x - \eta\mu^3 2x)$  Από Γ1, αν θεωρήσουμε  $\alpha = 2x$  τότε  $f(x) = 2\eta\mu 2x, A = \mathbb{R}$ .


Για κάθε  $x \in \mathbb{R}, -x \in \mathbb{R}$  και  $f(-x) = 2\eta\mu 2(-x) = -2\eta\mu 2x = -f(x)$ . Η συνάρτηση είναι περιττή.

ii) Από θεωρία είναι γνωστό ότι η συνάρτηση  $f(x) = \rho\eta\mu(\omega x), \rho > 0$  έχει ελάχιστο  $-\rho$ , μέγιστο  $\rho$  και περίοδο  $\frac{2\pi}{\omega}$ . Για  $\rho = 2$  και  $\omega = 2$ , προκύπτει,

Μέγιστη τιμή 2, Ελάχιστη -2 και περίοδος  $\frac{2\pi}{2} = \pi$ .

Γ3. Κατασκευάζουμε έναν πίνακα τιμών.

$x$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\pi$
$f(x)$	0	2	0	-2	0



Γ4.  $f(x)=1 \Leftrightarrow 2\eta\mu 2x=1 \Leftrightarrow \eta\mu 2x=\frac{1}{2} \Leftrightarrow \eta\mu 2x=\eta\mu \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} 2x=2k\pi+\frac{\pi}{6} \\ 2x=2k\pi+\pi-\frac{\pi}{6} \end{cases} \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x=k\pi+\frac{\pi}{12} \\ x=k\pi+\frac{5\pi}{12} \end{cases} \kappa \in \mathbb{Z}. \text{ Επειδή, } x \in [0, \pi] \Leftrightarrow x=\frac{\pi}{12} \acute{\eta} x=\frac{5\pi}{12}.$$

Στο σχήμα του Γ3 επαληθεύεται από τη γραφική παράσταση ότι η ευθεία  $y = 1$  τέμνει τη γραφική παράσταση σε δύο σημεία που ασφαλώς έχουν τετμημένες  $\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}$ .

**ΘΕΜΑ Α**

**Δ1.** Για να έχει νόημα το  $f(x)$  πρέπει  $\alpha - \eta\mu^2x \neq 0$ . Για  $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$  είναι  $\eta\mu^2x = 1$ .

Από τα προηγούμενα και το πεδίο ορισμού  $A$  συμπεραίνουμε ότι

$$\alpha - \eta\mu^2x = 0 \Leftrightarrow \alpha - 1 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1.$$

**Δ2. i)** Έχουμε  $\sin x \leq 1 \Leftrightarrow 1 - \sin x \geq 0$  και  $1 - \eta\mu^2x = \sin^2x > 0$  για  $x \in A$ . Επομένως  $f(x) \geq 0$  για κάθε  $x \in A$

**ii)** Παρατηρούμε ότι για  $x=0$  είναι  $f(0)=0$ . Άρα  $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x) \geq f(0)$  για κάθε  $x \in A$

Επομένως η  $f$  παρουσιάζει ολικό ακρότατο στη θέση  $x=0$  και συγκεκριμένα ολικό ελάχιστο.

**Δ3. i)** Από την υπόθεση έχουμε  $g(x) = f(x - \pi) = \frac{1 - \sin(x - \pi)}{1 - (\eta\mu(x - \pi))^2} = \frac{1 - (-\sin x)}{1 - (-\eta\mu x)^2} = \frac{1 + \sin x}{1 - \eta\mu^2x}$

**ii)** α' τρόπος

$$\begin{aligned} g^2(x) > f^2(x) &\Leftrightarrow g^2(x) - f^2(x) > 0 \Leftrightarrow (g(x) + f(x))(g(x) - f(x)) > 0 \Leftrightarrow \\ &\left( \frac{1 + \sin x}{1 - \eta\mu^2x} + \frac{1 - \sin x}{1 - \eta\mu^2x} \right) \left( \frac{1 + \sin x}{1 - \eta\mu^2x} - \frac{1 - \sin x}{1 - \eta\mu^2x} \right) > 0 \Leftrightarrow \frac{2}{\sin^2x} \frac{2\sin x}{\sin^2x} > 0 \Leftrightarrow \\ &\frac{4}{\sin^3x} > 0 \Leftrightarrow \sin^3x > 0 \Leftrightarrow \sin x > 0 \end{aligned}$$

Η τελευταία είναι αληθής στο  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  επομένως, λόγω των ισοδυναμιών αληθεύει και η αρχική.

β' τρόπος

$$g^2(x) = \left( \frac{1 + \sin x}{1 - \eta\mu^2x} \right)^2 = \frac{1 + \sin x}{(\sin^2x)^2} = \frac{1 + 2\sin x + \sin^2x}{\sin^4x}$$

$$f^2(x) = \left( \frac{1 - \sin x}{1 - \eta\mu^2x} \right)^2 = \frac{1 - \sin x}{(\sin^2x)^2} = \frac{1 - 2\sin x + \sin^2x}{\sin^4x}$$

$$g^2(x) - f^2(x) = \frac{1 + 2\sin x + \sin^2x}{\sin^4x} - \frac{1 - 2\sin x + \sin^2x}{\sin^4x} = \frac{4}{\sin^3x}$$

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022**  
Α΄ ΦΑΣΗ**E\_3.Μλ2ΓΑ(α)**

Για  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  είναι

$\sin x > 0$  άρα και  $\sin^3 x > 0$  επομένως  $\frac{4}{\sin^3 x} > 0$ . Έτσι έχουμε τελικά

$$g^2(x) - f^2(x) > 0 \Leftrightarrow g^2(x) > f^2(x)$$

ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ